

Mathematik I für Biologen, Geowissenschaftler und Geoökologen  
Trigonometrie

Stefan Keppeler

7. November 2011



## Prolog

Quadratische Gleichungen

Satz des Pythagoras

## Winkel

## Trigonometrische Funktionen

Definition

Graphen von  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ .

Beispiel: Schwingungen

Additionstheoreme

Umkehrfunktionen



Quadratische Gleichungen in einer Variablen sind von der Form

$$ax^2 + bx + c = 0$$


mit  $a \neq 0$  (sonst ist es eine lineare Gleichung) und besitzen die Lösungen

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$


Erhält man durch quadratische Ergänzung.



**Satz:** In einem rechtwinkligen Dreieck gilt  $a^2 + b^2 = c^2$ .



**Beweis:** 

**Beispiel:** Entfernung des Horizonts 

Die gängigen Einheiten zur Winkelmessung sind das **Gradmaß** und das **Bogenmaß** ( $\varphi = l/r$ ,  $l =$  Länge des Kreisbogens mit Radius  $r$  zum Öffnungswinkel  $\varphi$ ).

Gradmaß	Bogenmaß
$360^\circ$	$2\pi$
$180^\circ$	$\pi$
$90^\circ$	$\pi/2$
$57^\circ 17' 45''$	1
$45^\circ$	$\pi/4$
$30^\circ$	$\pi/6$
$1^\circ$	0,0175

Allgemein:  $g = (360^\circ/2\pi)b$  bzw.  $b = (2\pi/360^\circ)g$ .

$(1/60)^\circ = 1' = 1$  (Bogen-)Minute,

$(1/60)' = 1'' = 1$  (Bogen-)Sekunde.



**Definition:** Winkelfunktionen (im rechtwinkligen Dreieck)

$$\sin = \text{Sinus} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}, \quad \cos = \text{Kosinus} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}},$$

$$\tan = \text{Tangens} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}, \quad \cot = \text{Kotangens} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Gegenkathete}}.$$

Die folgenden braucht man eigentlich nicht...

$$\sec = \text{Sekans} = \frac{\text{Hypotenuse}}{\text{Ankathete}}, \quad \csc = \text{Kosekans} = \frac{\text{Hypotenuse}}{\text{Gegenkathete}}.$$


**Beispiel:** Die Steigung einer schiefen Ebene ist der Tangens des Neigungswinkels.





Geometrische Deutung als  
Streckenlängen mit Vorzeichen  
am Einheitskreis.

Satz des Pythagoras:

$$\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1.$$





$$\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

## Periodizität:

- ▶  $f(x + 2\pi) = f(x)$  für  $f = \sin, \cos, \tan$
- ▶ auch  $f(x + 2\pi n) = f(x)$  für alle  $n \in \mathbb{Z}$
- ▶ für Tangens sogar  $\tan(x + n\pi) = \tan x \quad \forall n \in \mathbb{Z}$





Bei **Schwingungsphänomenen** (Oszillationen), z.B., Vibration, Schall, Licht) oder Rotationsbewegung ist eine Größe  $S(t)$  eine periodische Funktion der Zeit,  $S(t + T) = S(t)$ ,



- ▶  $T =$  Periode
- ▶  $1/T =$  Frequenz = Anzahl Schwingungen pro Zeit  $= \nu = f$

**Harmonische Oszillationen** sind Funktionen der Form

$$S(t) = c \sin(\omega t + \alpha) = c \cos(\omega t + \beta),$$

- ▶ periodisch mit Periode  $T = 2\pi/\omega$
- ▶  $c =$  Amplitude
- ▶  $\alpha =$  Phasenverschiebung
- ▶  $\omega =$  (Kreis-)Frequenz  $= 2\pi\nu$ .



## Additionstheoreme (ohne Beweis):

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

### Beispiel:

Bestimmung der Höhe eines Baumes  $h = h_1 + s \tan \alpha$   
aus der Messung von  $h_1$ ,  $s$  und  $\alpha$ .



$\sin$  auf  $[-\pi/2, \pi/2]$  streng monoton wachsend  
 $\rightsquigarrow$  Umkehrfunktion

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$$

entsprechend  $\cos$  auf  $[0, \pi]$   $\rightsquigarrow$  Umkehrfunktion

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

und  $\tan$  auf  $(-\pi/2, \pi/2)$   $\rightsquigarrow$  Umkehrfunktion

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$$

**Beispiel:** Sonnenhöhe

$s$ : Länge eines senkrechten Stabes

$b$ : Länge seines Schattens

Sonnenhöhe:  $\varphi = \arctan(s/b)$ . 