

Mathematik I für Biologen, Geowissenschaftler und Geoökologen  
Differenzialrechnung

Stefan Keppeler

17. Dezember 2012



## Beispiel

Anglerlatein

## Ableitungen

Definition

Tangente

Beispiel: Geschwindigkeit

Ableitungen einiger Funktionen

Summen- & Produktregel

Kettenregel



Ableitung der Umkehrfunktion

## Extrema

notwendige Bedingung

hinreichende Bedingung





Welche Sportart passt zu diesem Graphen?

- ▶ Angeln
- ▶ Stabhochsprung
- ▶ 100m-Lauf
- ▶ Fallschirmspringen
- ▶ Golf
- ▶ Speerwerfen
- ▶ Hochsprung
- ▶ Turmspringen
- ▶ Drag Racing
- ▶ Wasserski

nach W. Herget, <http://did.mathematik.uni-halle.de/lehrerseite>



**Definition:** Die Funktion  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^d$  heißt **differenzierbar im Punkt**  $x \in (a, b)$ , wenn der folgende Grenzwert existiert:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x).$$

Dieser Wert heißt der **Differenzialquotient** oder **die (erste) Ableitung von  $f$  in  $x$** .



- ▶ Ist  $f$  auf dem gesamten Definitionsbereich  $D = (a, b)$  differenzierbar, so heißt die dadurch definierte Funktion  $f' : D \rightarrow \mathbb{R}^d$  die **(erste) Ableitung von  $f$** .
- ▶ Ist  $f'$  wiederum auf ganz  $D$  differenzierbar, so heißt die Ableitung von  $f'$  die **zweite Ableitung** von  $f$ ,  $f''$ .
- ▶ Ist  $f''$  auch auf ganz  $D$  differenzierbar, so heißt die Ableitung von  $f''$  die **dritte Ableitung** von  $f$ ,  $f'''$ , und so weiter.



$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , **Tangente in**  $x_0 \in (a, b)$ :

$$T(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$



Tangente  $T$  als **Näherungsfunktion** für  $f$  in der Nähe von  $x_0$ .

**Anwendung:** Größtfehlerabschätzung

- ▶ gemessen:  $x$  mit Ungenauigkeit  $\delta x$
- ▶ gesucht: Wert der Größe  $y = f(x)$  mit Ungenauigkeit  $\delta y$
- ▶ näherungsweise:  $\delta y = |f'(x)| \delta x$ .



**Beispiel:** ein punktförmiges Objekt befinde sich zur Zeit  $t$  am Ort

$$\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^d$$

- ▶  $\vec{x} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$  heißt **Kurve** im  $\mathbb{R}^d$
- ▶ **mittlere Geschwindigkeit** im Zeitintervall  $[a, b]$

$$\vec{v} = \frac{\vec{x}(b) - \vec{x}(a)}{b - a}$$

- ▶ (Momentan-) **Geschwindigkeit** zur Zeit  $t \in [a, b]$

$$\vec{v}(t) = \vec{x}'(t) \quad \img alt="pencil icon" data-bbox="655 578 704 644"/>$$

- ▶ **Notation:** Zeitableitung mit Punkt statt Strich,  $\dot{\vec{x}}$  statt  $\vec{x}'$
- ▶ Betrag der Geschwindigkeit:  $|\dot{\vec{x}}(t)|$
- ▶ **Bewegungsrichtung:** Einheitsvektor in Richtung von  $\dot{\vec{x}}(t)$ ,

$$\vec{e}_{\dot{\vec{x}}(t)} = \frac{\dot{\vec{x}}(t)}{|\dot{\vec{x}}(t)|}$$



zweite Ableitung  $\ddot{f}(t)$ : **Beschleunigung**  
Änderung des Geschwindigkeitsvektors  $\dot{f}(t)$  mit der Zeit

Bedeutung von $f(t)$	Bezeichnung für $\dot{f}(t)$
Position [m]	Geschwindigkeit [m/s]
Geschwindigkeit [m/s]	Beschleunigung [m/s <sup>2</sup> ]
Winkel [°]	Winkelgeschwindigkeit [1/s]
Menge [X]	Zuwachsrate [X/s]
Energie [Joule]	Leistung [Watt]
el. Ladung [Coulomb]	el. Strom [Ampere]

**Notation:**  $f' = \frac{df}{dx}$  oder  $\dot{f} = \frac{df}{dt}$  wenn  $f$  Funktion von  $x$  bzw.  $t$



## Ableitungen einiger wichtiger Funktionen ( $\alpha \in \mathbb{R}$ )

$f$	$f'$
$x \mapsto c$	$x \mapsto 0$
$x \mapsto \alpha x$	$x \mapsto \alpha$
$x \mapsto x^\alpha$	$x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$
exp	exp
log	$x \mapsto \frac{1}{x}$
sin	cos
cos	$-\sin$

Beispiel: 



## Satz: (Summen- und Produktregel)

Sind  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$  differenzierbar, so auch  $f + g$  und  $\alpha f$  für  $\alpha \in \mathbb{R}$  mit

- ▶  $(f + g)' = f' + g'$  und
- ▶  $(\alpha f)' = \alpha f'$ .

Im Fall  $d = 1$  ist auch  $fg$  differenzierbar mit  $(fg)' = f'g + g'f$ .

**Beweis:** 

**Beispiel:** Ableiten eines Polynoms

$$\frac{d}{dx} \sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^n \frac{d}{dx} a_k x^k = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} x^k$$



## Satz: (Kettenregel)

Sind  $g : [a, b] \rightarrow [c, d]$  und  $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^d$  differenzierbar, dann ist die verkettete Funktion

$$\begin{aligned} h &:= f \circ g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d \\ x &\mapsto f(g(x)) \end{aligned}$$

differenzierbar mit  $h'(x) = f'(g(x)) g'(x)$ .

**Beweisidee:** 

**Beispiele:**

- ▶  $(e^{-\lambda x})' = -\lambda e^{-\lambda x}$
- ▶  $(e^{-x^2})' = -2x e^{-x^2}$



## Ableitung der Umkehrfunktion:

Hat die Funktion  $f : [a, b] \rightarrow [c, d]$  eine **Umkehrfunktion**  $f^{-1}$ ,

▶ so gilt  $f^{-1}(f(x)) = x$ .

▶ Mit der Kettenregel folgt  $f^{-1}'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$



und damit

$$f^{-1}'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

(falls Nenner  $\neq 0$ )

So bestimmt man die Ableitungen von **log**, **arcsin**, **arccos**, **arctan**  
aus denen von **exp**, **sin**, **cos**, **tan**.

**Beispiel:** **log'**



**Extrema:** Oft möchte man für eine Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  wissen, wo sie ihr Maximum und ihr Minimum annimmt. Für Maximum oder Minimum sagt man auch Extremum.

**Satz:** Ist  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar und hat im Punkt  $x \in (a, b)$ , der nicht am Intervallende liegt, ein (lokales) Extremum, dann gilt  $f'(x) = 0$ .

**Grund:** Horizontale Tangente. 



**Umgekehrung gilt nicht:** Sei  $x \in (a, b)$ . Wenn  $f'(x) = 0$ , muss nicht unbedingt ein Extremum vorliegen.

**Beispiel:**  $f(x) = x^3$  hat  $f'(x) = 3x^2$  mit Nullstelle bei  $x = 0$ , aber dort weder Maximum noch Minimum.



**Allerdings:** Wenn  $f'(x) = 0$  und  $f''(x) > 0$  (oder  $f''(x) < 0$ ), dann hat  $f$  in  $x$  ein **lokales Minimum** (bzw. ein lokales Maximum), d.h. es gibt ein Intervall  $[c, d] \subseteq [a, b]$  mit  $x \in [c, d]$ , so dass in  $x$  das eindeutige Minimum (bzw. Maximum) von  $f$  auf  $[c, d]$  liegt.

