

---

## Geometrie : Übungsblatt 1

---

Wjatscheslaw Kewlin

15. Oktober 2013

**Diese Aufgaben sind schriftlich auszuarbeiten und bis vor der Vorlesung am 24. Oktober abzugeben. Für jede Aufgabe gibt es 4 Punkte.**

Wie in der Vorlesung bezeichne  $\mathbb{RP}^2$  die reelle projektive Ebene, d.h. die Menge der eindimensionalen linearen Unterräume von  $\mathbb{R}^3$ . Die Punkte mit homogenen Koordinaten der Form  $[x : y : 1] \in \mathbb{RP}^2$  identifizieren wir mit  $\mathbb{R}^2$ . Punkte der Form  $[x : y : 0] \in \mathbb{RP}^2$  identifizieren wir mit Richtungen in  $\mathbb{R}^2$  und sehen sie als “unendlich ferne Punkte” von  $\mathbb{R}^2$  an.

**Aufgabe 1.** Seien  $P_1, P_2, P_3$  und  $Q_1, Q_2, Q_3$  zwei geordnete Tripel paarweise verschiedener Punkte in  $\mathbb{R}^2$ . Zeigen Sie:

- a) Sind beide Tripel nicht kollinear, so gibt es eine eindeutige affine Transformation, die  $P_i$  auf  $Q_i$ ,  $i = 1, 2, 3$  abbildet.
- b) Sind beide Tripel kollinear, so gibt es genau dann eine affine Transformation, die  $P_i$  auf  $Q_i$ ,  $i = 1, 2, 3$  abbildet, wenn

$$\frac{P_1 - P_2}{P_2 - P_3} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_2 - Q_3},$$

wobei die Quotienten definiert sind, da beide Tripel kollinear sind.

**Aufgabe 2.** Eine inhomogene lineare Gleichung

$$ax + by + c = 0$$

mit  $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$  kann man in die homogene Gleichung

$$ax + by + cz = 0$$

umwandeln, deren Lösungen mit  $z = 1$  den Lösungen der inhomogenen Gleichung entsprechen.

- a) Die homogene Gleichung definiert eine Gerade in  $\mathbb{RP}^2$ . Unter welcher Bedingung an diese Gerade definiert die inhomogene Gleichung eine Gerade in  $\mathbb{R}^2$ ?
- b) Geben Sie eine projektiv-geometrische Interpretation der Lösungstheorie von Systemen inhomogener Gleichungen in zwei Variablen, die aus zwei Gleichungen der obigen Form bestehen.

**Aufgabe 3.** Zeigen Sie:

- a) Zu je zwei verschiedenen Punkten in  $\mathbb{RP}^2$  gibt es genau eine Gerade, die beide Punkte enthält.
- b) Je zwei verschiedene Geraden in  $\mathbb{RP}^2$  schneiden sich in genau einem Punkt.

**Aufgabe 4.** Seien  $l, l'$  zwei Geraden in  $\mathbb{RP}^2$  und  $P$  ein Punkt mit  $P \notin l, l'$ .

- i) Für jeden Punkt  $Q' \in l'$  gibt es einen eindeutigen Punkt  $Q \in l$ , so daß  $P, Q$  und  $Q'$  kollinear sind. Die Abbildung  $Q' \mapsto Q$  nennt man die Zentralprojektion von  $l'$  auf  $l$  mit Projektionszentrum  $P$ .

Nehmen wir an, daß  $l$  nicht gleich der unendlich fernen Geraden ist, so gibt es eine affine Transformation, die  $l$  auf die  $x$ -Achse und  $P$  auf den Punkt  $[0, 1, 0]$  oder den Punkt  $[0, -1, 1]$  abbildet (je nachdem, ob  $P$  auf der unendlich fernen Geraden liegt oder nicht). Nehmen wir weiter an, daß auch  $l'$  nicht gleich der unendlich fernen Geraden ist, so kann der affine Teil  $l' \cap \mathbb{R}^2$  von  $l'$  in Punkt-Richtungs-Form

$$\left\{ x' \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b \\ d-1 \end{pmatrix} \mid x' \in \mathbb{R} \right\}$$

geschrieben werden mit  $a, b, c$ , und  $d \in \mathbb{R}$ .

- ii) Berechnen Sie im Fall eines unendlich fernen Projektionszentrums  $P = [0, 1, 0]$  die obige Projektion explizit als Abbildung von  $x'$  nach  $x$ . Warum ist in diesem Fall  $a \neq 0$ ?
- iii) Berechnen Sie im Fall eines endlichen Projektionszentrums  $P = [0, -1, 1]$  die obige Projektion explizit als Abbildung von  $x'$  nach  $x$ . (Warum gilt in diesem Fall  $ad - bc \neq 0$ ?)

**Aufgabe 5.\*** Berechnen Sie explizit die Zentralprojektion von der  $x$ -Achse auf die  $y$ -Achse mit Projektionszentrum  $[-1 : 1 : 1]$  (vgl. Aufgabe 4). Visualisieren Sie die Abbildung durch eine Skizze. Berechnen Sie die Bilder der Punkte  $x = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ . Was ist das Urbild des unendlich fernen Punktes auf der  $y$ -Achse und was ist das Bild des unendlich fernen Punktes auf der  $x$ -Achse? Welche Abbildung der  $y$ -Achse entspricht der Translation  $x \mapsto x + 1$ ?