

LINEARE ALGEBRA 2

BLATT 9

Abgabe: Donnerstag, den 25.06.2026, 10:00 Uhr

- ⊛ **Aufgabe 1.** Bestimme rationale und Jordansche Normalform für die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & -1 \\ 4 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(4, 4; \mathbb{C}).$$

Bestimme eine Matrix $S \in \text{GL}(4; \mathbb{C})$ so, dass $S \cdot A \cdot S^{-1}$ die Jordansche Normalform annimmt.

- Aufgabe 2.** Bestimme A^{1229} für die reelle (3×3) -Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(3, 3; \mathbb{R}).$$

- ⊛ **Aufgabe 3.** Es seien \mathbb{K} ein Körper und $J \in \text{Mat}(n, n; \mathbb{K})$ eine Matrix in Jordanscher Normalform, d. h.,

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_r \end{pmatrix}, \quad J_i := \begin{pmatrix} J(k_{i1}, \lambda_i) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J(k_{id_i}, \lambda_i) \end{pmatrix}$$

wobei $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ paarweise verschieden sind. Zeige: Die Eigenwerte von J sind $\lambda_1, \dots, \lambda_r$. Dabei besitzt λ_i die algebraische Vielfachheit $k_{i1} + \dots + k_{id_i}$ und die geometrische Vielfachheit d_i .

Aufgabe 4. Es sei $A \in \text{Mat}(n, n; \mathbb{K})$ eine Matrix in Jordanscher Normalform und es sei $A = D + N$, wobei $D \in \text{Mat}(n, n; \mathbb{K})$ eine Diagonalmatrix ist und $N \in \text{Mat}(n, n; \mathbb{K})$ höchstens auf der (unteren) Nebendiagonalen nichttriviale Einträge besitzt. Zeige:

- (i) Es gilt $D \cdot N = N \cdot D$.
 (ii) Es gilt $(D + N)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} D^i N^{k-i}$.