

Übungen zur Vorlesung Lineare Algebra II
Sommersemester 2019

Blatt 5

Abgabetermin: Mittwoch, 3.7.2019, 10:15 Uhr

Aufgabe 1

(1+4=5 Punkte)

Sei $E := (e_1, \dots, e_4)$ die Standardbasis des $\mathbb{R}^4$ und sei $\alpha \in \bigwedge^2 \mathbb{R}^4$ durch $\alpha := e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_3 + e_2 \wedge e_4 + e_3 \wedge e_4$ gegeben.

- (a) Zeigen Sie, dass α zerlegbar ist.
- (b) Zeigen Sie, dass die Abbildung $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \bigwedge^3 \mathbb{R}^4$, $x \mapsto x \wedge \alpha$ linear ist und bestimmen Sie die Abbildungsmatrix ${}_E M_B(f)$ von f bezüglich der Basen E und B , wobei die Basis B von $\bigwedge^3 \mathbb{R}^4$ durch $B := (e_1 \wedge e_2 \wedge e_3, e_1 \wedge e_2 \wedge e_4, e_1 \wedge e_3 \wedge e_4, e_2 \wedge e_3 \wedge e_4)$ gegeben ist.

Aufgabe 2

(6 Punkte)

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und sei $(v_1, \dots, v_n)$ eine Familie von linear unabhängigen Vektoren in V . Seien $v'_1, \dots, v'_n \in V$, und seien $U := \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ und $U' := \langle v'_1, \dots, v'_n \rangle$ zwei Unterräume von V . Zeigen Sie, dass $U = U'$ genau dann gilt, wenn ein $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ existiert, sodass $v_1 \wedge \dots \wedge v_n = \lambda(v'_1 \wedge \dots \wedge v'_n)$.

Aufgabe 3

(3+3=6 Punkte)

Seien V, W zwei $\mathbb{K}$ -Vektorräume und sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung.

- (a) Sei f von endlichem Rang $m \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass $\text{Rang}(\bigwedge^n f) = \binom{m}{n}$ für alle $n \in \mathbb{N}_{>0}$ gilt.
- (b) Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:
 - (1) f hat endlichen Rang.
 - (2) Für *fast alle* (d.h. für alle bis auf endlich viele) $n \in \mathbb{N}_{>0}$ gilt $\bigwedge^n f = 0$.
 - (3) Es existiert ein $s \in \mathbb{N}_{>0}$ mit $\bigwedge^s f = 0$.

Wir definieren die *Spur* einer quadratischen Matrix als Summe ihrer Diagonaleinträge. Für einen Endomorphismus f definiert man $\text{Spur}(f)$ als Summe der Diagonaleinträge einer beliebigen Darstellungsmatrix von f . Man kann zeigen, dass die Spur einer Matrix unter Basiswechsel invariant ist (das folgt zum Beispiel direkt aus Aufgabe 3(b) von Blatt 10 der linearen Algebra I). Deshalb ist $\text{Spur}(f)$ wohldefiniert. Außerdem definieren wir $\bigwedge^0 V := \mathbb{K}$ und $\bigwedge^0 f := \text{id}_{\mathbb{K}}$ für einen $\mathbb{K}$ -Vektorraum V .

Aufgabe 4

(8 Punkte)

Sei V ein n -dimensionaler Vektorraum. Sei $f \in \text{End}(V)$ ein Endomorphismus mit charakteristischem Polynom $\chi_f(x) = \sum_{k=0}^n a_{n-k} x^k$. Zeigen Sie, dass $a_k = (-1)^{n-k} \text{Spur}(\bigwedge^k f)$ für $k = 0, \dots, n$ gilt.

Die zusammengetackerten Übungsblätter können im Postfachzimmer A16 des C-Gebäudes im 3. Stock im Briefkasten des jeweiligen Übungsleiters abgegeben werden.