

# Mathematik 1 für Naturwissenschaftler\*innen

Übungsblatt 15 (keine Abgabe, Besprechung im Sommersemester)

---

## Aufgabe 78

Zeigen Sie: Die Funktionen  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nx), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nx), n \in \mathbb{N}$  bilden ein Orthonormalsystem (ONS) in  $C([0, 2\pi])$  bezüglich des Skalarprodukts aus Aufgabe 76.

## Aufgabe 79 (Fourierreihen)

Die Funktionen aus Aufgabe 78 bilden nicht nur ein ONS sondern tatsächlich auch die  $\infty$ -dimensionale Verallgemeinerung einer Basis (eine sogenannte Schauderbasis bzw. ein vollständiges ONS)<sup>1</sup>. Sie können nun ein Element aus  $f \in C([0, 2\pi])$ , d.h. eine stetige Funktion  $f(x)$ , in diese Basis entwickeln, d.h. die Funktion als Linearkombination der Basisfunktionen darstellen,<sup>2</sup>

$$f(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}} + b_n \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}} \right). \quad (*)$$

Die Koeffizienten  $a_n$  und  $b_n$  erhalten Sie, indem Sie das Skalarprodukt von  $f$  mit den Basisvektoren bilden (vgl. Abschnitt 5.5 der Vorlesung), d.h.

$$a_0 = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, f \right\rangle, \quad a_n = \left\langle \frac{\cos(n\cdot)}{\sqrt{\pi}}, f \right\rangle, \quad b_n = \left\langle \frac{\sin(n\cdot)}{\sqrt{\pi}}, f \right\rangle \quad \text{für } n \in \mathbb{N},$$

bzw. explizit

$$a_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} \cos(nx) f(x) dx, \quad b_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} \sin(nx) f(x) dx.$$

Wir nennen (\*) die Fourierreihe von  $f$ . Bestimmen Sie die Fourierreihen von

- a)  $f(x) = \cos^2 x$
- b)

$$g(x) = \begin{cases} x & , \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x & , \quad \frac{\pi}{2} < x \leq \frac{3\pi}{2} \\ x - 2\pi & , \quad \frac{3\pi}{2} < x \leq 2\pi \end{cases}$$

HINWEISE: Für Teil (a) müssen Sie keine Integrale ausrechnen. Skizzieren Sie für Teil (b) zunächst den Graph von  $g$  und überlegen Sie sich, dass  $a_n = 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$  und  $b_{2n} = 0 \forall n \in \mathbb{N}$  (warum?).

---

<sup>1</sup>Eigentlich sollten wir hier besser nicht nur von  $C([a, b])$  sprechen, sondern von "etwas größeren" Funktionenräumen...

<sup>2</sup>Für hinreichend gutartige Funktionen konvergiert die Reihe dann auch wieder gegen die Funktion.