

Mathematik II für Biologen

Übungsblatt 2 (Abgabe am 23.04.2007)

Bitte geben Sie bei Ihren Lösungen stets einen vollständigen Rechenweg und eine verständliche Begründung an. Bitte schreiben Sie in ganzen Sätzen. Abgabe **vor** der Vorlesung.

Aufgabe 4

(10 Punkte)

Herr Schieber ist Geschäftsführer in der Automobilbranche. Ihm unterstehen zwei Filialen mit insgesamt 10 Verkäufern, von denen drei in der Filiale Rostlaube arbeiten: Einer verkauft pro Woche ein Auto, der zweite zwei und der dritte drei. In der Filiale Coupé sind sieben Händler angestellt: Der erste verkauft vier Autos pro Woche, der zweite fünf, der dritte sechs usw., der Spitzenmann schafft beeindruckende zehn Autos pro Woche. Nochmals zur Übersicht:

Filiale Rostlaube: 1 2 3 Mittelwert 2

Filiale Coupé: 4 5 6 7 8 9 10 Mittelwert 7

Im Mittel werden also in der Filiale Rostlaube pro Verkäufer und Woche zwei Autos und in der Filiale Coupé sieben abgesetzt. Das ist dem Geschäftsinhaber zuwenig. Herr Schieber bekommt eine knapp bemessene Frist, die durchschnittlichen Umsatzzahlen pro Filiale zu verbessern.

Wie kann er allein durch Umstrukturierung die durchschnittlichen Verkaufszahlen in beiden Filialen um jeweils zwei erhöhen?

Aufgabe 5 (Bitte bearbeiten Sie diese Aufgabe ohne Matlab o.Ä.)

(10 Punkte)

In einem See befinden sich 10 Karpfen. Sie wurden gewogen, und die Ergebnisse x_1, x_2, \dots, x_{10} waren (in kg)

2,1 3,2 1,6 1,7 2,8 2,4 1,8 1,8 5,3 2,6.

- Welchen Wert hat $x_{(7)}$?
- Berechnen Sie
 - den Mittelwert und den Median,
 - die (empirische) Varianz und die (empirische) Standardabweichung und
 - die Medianabweichung MADder Stichprobe.
- Bei einer Überprüfung der Daten stellt sich heraus, dass es sich bei der Zahl 5.3 um einen Abschreibfehler handelt. Es hätte 3.3 sein sollen. Welche der in Teil (b) berechneten Größen ändern sich nach der Korrektur dieses Fehlers? (Sie brauchen die neuen Größen nicht neu zu berechnen.)

Aufgabe 6

(10 Punkte)

- Finden Sie eine Stichprobe x_1, x_2 mit arithmetischem Mittelwert $\bar{x} = -2$ und (empirischer) Standardabweichung $s_x = 3$.
- Finden Sie für die in (a) gefundene Stichprobe eine Zahl b , für die die neue Stichprobe y_1, y_2 , gegeben durch $y_i := x_i + b$ ($i = 1, 2$), den Mittelwert $\bar{y} = 5$ hat. Wie lautet dann die Standardabweichung der Stichprobe y_1, y_2 ?
- Finden Sie für die in (a) gefundene Stichprobe eine Zahl a , für die die neue Stichprobe z_1, z_2 , gegeben durch $z_i := ax_i$ ($i = 1, 2$), den Mittelwert $\bar{z} = 6$ hat. Wie lautet dann die Standardabweichung der Stichprobe z_1, z_2 ?